

“众所周知,菊花原产我国,是我国十大传统名花之一,在我国已有3000多年栽培历史。《礼记》中记载:“季秋之月,菊有黄华。”可见当时人们就用菊花的物候期作为季节的标志。

“像我们喜欢在家里种花草的人,没事就会侍弄一番,但往往养的花没有外面卖的好看,总想请个专家教教我们。”10月17日,十堰市2020菊花展开展,吸引了众多菊花爱好者和游客前往赏菊。现场不少市民咨询工作人员家庭种植菊花要注意哪些事项,记者为此采访市园林花卉研究所花卉种植专家熊家军,了解家庭盆栽菊花养护秘诀。

■文、图/记者 叶楚榕



熊师傅正在养护菊花。

菊花展引起菊花热 赏完菊回家想自己养

花卉专家教你咋养菊

土壤配置很重要

19日下午,记者在人民公园菊花展精品展区见到了正在布展的熊家军。据悉,熊家军自1982年进入花卉研究所至今,一直从事盆栽研究和花卉养护工作,对菊花种植颇有研究。

“养花是个细致活,粗心大意的人建议不要养。”得知记者来意后,熊家军首先表示,不论养什么花都要花心思,经常打理,这样才有可能把花养好。

熊家军告诉记者,要想培育好一株菊花,首先就要选好土壤。

由于菊花是向阳生长的,土壤必须排水性好,土质疏松,所以选肥沃沙土最好。一般选用河沙、树林土、田园土、腐熟土,按照2:1:1:1的比例进行混合,并且及时浇水,保证土壤湿润。

熊家军介绍,浇水分平常期和花蕾期。平常时,总的原则就是保持土壤湿润,盆里干了就浇水。到了花蕾期需更多水,水分不足,就会导致花蕾长不大,花也开不好。但也不能一次浇水很多,菊花怕积水。

如何让菊花分枝多

喜欢养花的人经常有个疑问,为啥自己养的花没有外面花店卖的花好看呢?熊家军表示,有些花在外面是很好养的,到了家里却成了难题,很多养菊花的人,就发现了这个问题。他们觉得菊花在外面没人管,应该是很好养的,但是到了家中却被他们给养

死了。熊家军介绍,如果想让菊花分枝多,就要在菊花植株长至10多厘米高时开始摘心,摘心时上部分叶片全部摘除,只留植株基部4至5片叶,使植株保留3至6个主枝,以后长出的菊花就是多枝菊花。这种菊花很适合在小

菊花的3种繁殖方法

菊花有夏菊、秋菊和寒菊,分别在每年农历的5至9月、9至11月、12月至次年1月开花。当菊花凋谢后,就要准备扦插繁殖,因为如果不这样,原先的菊株等到第二年继续发枝,开出来的花很小,也不好看。

熊家军告诉记者,常见的菊花繁殖方法有3种。第一种芽插,在秋冬时及时切除侧枝的茎芽进行扦插,选芽一定要找较远的位

置,并且保证芽头丰满,再把选好的芽苗放在温室或大棚的沙床里,保持10度左右的室温,到了春季可放在室外,保持良好的通风性,以更好地促进芽苗的生长发育。

第二种是地插,选用适量的田园土以及糠土铺在地面上,并搭建一个遮阴的高棚,保持每天阳光充足,从枝条上剪掉一部分叶芽,插入地床中,表面露出三

“一般用磷肥、钾肥较好。”熊家军介绍,在菊花生长期可选用磷肥、钾肥溶液进行喷洒。因为此时正是根部生长发育的关键时期,施肥的方式可采用喷洒和土壤追肥相结合,并浇入适量的水分,最好每周一次,保持根部发育。

由于菊花向阳生长,因此一般情况下可放置在阳台上,照射自然光,但也要注意,当温度过高时,避免长时间暴晒,否则会出现叶黄枯萎的现象。

院内栽培。

如果想让菊花每根枝头保留一朵较大的菊花,就要在植株长至10多厘米高时多次摘心,有效控制植株高度和株型。最后一次摘心时,要对菊花植株进行修剪,单枝上只留顶端一个花蕾,这样菊花盛开时花朵较大。

分之一,浇入适量的水,保持土壤湿润。光照强烈的可进行遮阴处理,大概两周后就可以发芽生根了。

第三种是嫁接,为了让菊花生长更为茂盛,可以采用黄蒿进行嫁接,最好在秋末采用黄蒿,冬季在温室中或大棚里播种。保持温度适宜,15摄氏度左右最佳。到了春季可放在室外嫁接生长,这样植株才会更高更直。

菊花常见病虫害如何防治

病虫害防治是菊花栽培中的重要环节,熊家军介绍,应本着以防为主、防重于治、综合防治的原则。在防治过程中,对防治的病虫不要只使用一种药物,要用两种以上药物交替使用,以防发生抗药现象。

菊花白粉病主要表现在菊花叶片和茎芽的位置,在菊花盛花期最容易产生。会长一部分白色斑点,如果不注重防护,会越来越多,甚至造成植株枯萎死亡。应该不定期清理植株上的落叶和枯枝,防止养分流失,并且喷洒适量的粉锈宁溶液。

菊花褐斑病,初发病时叶片上出现圆形或椭圆形病斑,病斑大小不等,呈黄色或紫褐色,后期转为暗褐色下陷的病斑,病斑逐渐扩大,严重时多数病斑相连,叶面焦枯,而后脱落。防治方法:及时清除病叶减少病源,选择健壮母株进行繁殖。浇水时避免弄湿下部叶子,雨后及时排水。定期喷洒50%多菌灵800液或75%百菌清800倍液,每7至10天一次。

朱砂叶螨又名红蜘蛛,多发生在夏季高温干燥时期,以7至8月最为猖獗,容易造成叶片干黄枯死,对菊花危害极大。防治时可清除菊圃内落叶杂草,冬春季在菊圃喷洒波美1-2度石硫合剂1至2次,以减少越冬虫的密度。3至5月喷洒40%三氯杀螨醇1000倍液3至5次,可杀死成虫和卵,并破坏雌虫的生殖能力,7至9月虫害严重时用20%灭扫利2000倍液、40%扫螨净粉剂2000倍液,交替在叶背喷洒2至3次效果最好。